

Palvelutarve Pohjois-Pohjanmaalla

Syntyvyys on suuri

Nuoria on paljon, alle 18-vuotiaita on 23 % väestöstä

7—15-vuotiaita 13 %

16—24-vuotiaita 11 %

lääkkeitä vähän yli 75-vuotiaita 8 %, määrä kasvaa 2020-luvulla 63 %

Sairastavuus maan keskitasoa korkeampi

THL **sairastavuusindeksi** 118, ikävakiointuna 122

Sepelvaltimotauti 112 , Aivoverisuonitaudit 117, Mielensterveysindeksi 131, Tuki- ja liikuntaelins. 139

Erytyiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 27 %, koko maa 26 % v. 2019

Chronin tauti 1, 1%, **sepelvaltimotauti** 4,6 %

Kuntoutuspsykoterapiaa saaneita 16—24-v. 1,7 %,

Mielensterveysperuteisesti sairauspäivärahaa saaneet 18—24-v. 3,1 %, 25—64-v. 3,3 %, maan kolmanneksi suurimmat osuudet

Palvelujen saatavuus vaihtelee

Perustoimeentulotuen käsittely 7 vrk:ssa

Kela ok, kunnissa 98-99 % ok

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit hyvällä tasolla

aloittaminen 7 vrk:ssa 98 %, valmistuminen 3 kk:ssa 97-98 %

Kouluterveydenhoitajalle pääsyssä ongelmia ammatillisessa oppilaitoksessa 6%

Koululääkäreitä niukasti, myös toisen asteen opisk.th:ssa

Psykologeja ja kurattoreita vähän

Lastenneuvolahoitajilla suositusten ylittävä määrä lapsia

ESH: lähetteet hyvin, > 6kk 2,8 %, mediaani 47 maan pisimpiä

Suun th:ssa HLL:lle vastaaotto yli 21 päivän kuluttua, maan keskitasoa X/2019 50%
että III/2020 48 %, valvonnan kohde kolmessa kunnassa

PTH:ssa määräajan ylityksiä poikkeavan paljon, viikon sisällä noin puolet

Laatu vaihtelee

- Rokotuskattavuus parantunut vuodesta 2019 vuoteen 2020
 - Influenssa rokotuskattavuus 65 vuotta täyttäneet vain 39 % v. 2019, vuonna 2020 45 %
 - DTaP-IPV-Hib 91 %,
 - 1. annos MPR 92 % ja 2.annos 89 %
 - HPV rokotus 43 % vuonna 2019, vuonna 2020 58 %
- Terveyskeskuksen lääkärivastaanoton käyntisyiden kirjausaste 44 %
- Kaksisuuntaisen mielenterveyshäiriön vuodeosaston uusiutuminen 30 pv:n sisällä 23 %
- +Mielenterveysperusteista osasairauspäivärahaa käytettiin
- +Pitkät psykiatrian laitohoitojaksot, >90 päivää vähän
- +Iäkkäille sopimattomia lääkkeitä 20 %, koko maa 22 %, monilääkittyjä yli 75-v:sta 18 %
- +Kirurgisen hoidon komplikaatioita vähän
- +Antibioottia käytettiin epäspesifiin ylähengitystieinfektioon harvoin